

# NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA

služby kriminální policie a vyšetřování PČR

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým je poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se dospělí obvykle poraní při práci anebo rekreaci, **děti při hře na pískovišti či v parcích.**



## PORANĚNÍ O POHOZENOU JEHLU

### OPATŘENÍ, KTERÁ BYSTE MĚLI UDĚLAT PŘI PORANĚNÍ O POHOZENOU INJEKČNÍ JEHLU:

- Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krváčet. Krvácení sníží dávku viru. Ranku nemačkejte.
- Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
- **Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.**